

事 務 連 絡  
令和3年6月16日



公益社団法人日本薬剤師会 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について  
一部訂正について

標記について、別添写しのとおり、各都道府県、保健所設置市及び特別区衛生主管部(局)宛て通知しましたので、御了知の上、貴会会員に対し周知方御配慮お願いします。



事務連絡  
令和3年6月16日

各 

都道府県
保健所設置市
特別区

 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について」の  
一部訂正について

「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について」（平成28年3月28日付け薬生審査発0328第15号厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知）の別添「薬局製剤指針」において、一部誤りがあり別紙のとおり訂正しますので、貴管下関係業者に対し周知方お願いします。

薬局製剤指針 正誤表

別紙

(下線部分が訂正箇所)

訂正箇所		正	誤
一連番号	処方番号	該当箇所	
24	抗ヒスタミン薬3-②	用法及び用量 規格及び試験方法	1 回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人(15才以上)1包 <u>1.4g</u> 、11才以上15才未満 大人の2/3、7才以上11才未満 大人の1/2、3才以上7才未満 大人の1/3 本品は定量するとき、塩酸ブソイドエフエドリ ン(C <sub>10</sub> H <sub>15</sub> NO·HCl:201.69) <u>3.9</u> ~ <u>4.7</u> %、アリマジン酒石酸塩[(C <sub>18</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> S) <sub>2</sub> ·C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub> :746.99] <u>0.11</u> ~ <u>0.13</u> %及びブカフエイン水和物(C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub> ·H <sub>2</sub> O:212.21) <u>3.2</u> ~ <u>3.9</u> %を含む。 1 回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人(15才以上)1包 <u>1.2g</u> 、11才以上15才未満 大人の2/3、7才以上11才未満 大人の1/2、3才以上7才未満 大人の1/3 本品は定量するとき、 <i>d</i> -クロルフェニラミンマレイン酸塩(C <sub>16</sub> H <sub>19</sub> CIN <sub>2</sub> ·C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub> :390.87) <u>0.15</u> ~ <u>0.18</u> %、塩酸ブソイドエフエドリ ン(C <sub>10</sub> H <sub>15</sub> NO·HCl:201.69) <u>5.4</u> ~ <u>6.6</u> %、グリ チルリチン酸(C <sub>42</sub> H <sub>62</sub> O <sub>16</sub> :822.94) <u>5.0</u> ~ <u>6.1</u> % 及びブカフエイン水和物(C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub> ·H <sub>2</sub> O:212.21) <u>3.8</u> ~ <u>4.6</u> %を含む。
26	抗ヒスタミン薬5-②	用法及び用量 規格及び試験方法	1 回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 大人(15才以上)1包 <u>1.0g</u> 、11才以上15才未満 大人の2/3、7才以上11才未満 大人の1/2、3才以上7才未満 大人の1/3 本品は定量するとき、 <i>d</i> -クロルフェニラミンマレイン酸塩(C <sub>16</sub> H <sub>19</sub> CIN <sub>2</sub> ·C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub> :390.87) <u>0.18</u> ~ <u>0.22</u> %、塩酸ブソイドエフエドリ ン(C <sub>10</sub> H <sub>15</sub> NO·HCl:201.69) <u>5.4</u> ~ <u>6.6</u> %、グリ チルリチン酸(C <sub>42</sub> H <sub>62</sub> O <sub>16</sub> :822.94) <u>6.0</u> ~ <u>7.3</u> % 及びブカフエイン水和物(C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub> ·H <sub>2</sub> O:212.21) <u>4.5</u> ~ <u>5.5</u> %を含む。

訂正箇所		誤
一連番号	処方番号 該当箇所	
39	鎮咳去痰薬 12-③	用法及び 用量
		正 1 回量を次のとおりとし、1 日 3 回、4 時間以上の間隔において適宜服用する。 大人 (15 才以上) 1 包 1.6g, 11 才以上 15 才未満 大人の 2/3, 8 才以上 11 才未満 大人の 1/2, 5 才以上 8 才未満 大人の 1/3, 3 才以上 5 才未満 大人の 1/4
		誤 1 回量を次のとおりとし、1 日 3 回、4 時間以上の間隔において適宜服用する。 大人 (15 才以上) 1 包 1.5g, 11 才以上 15 才未満 大人の 2/3, 8 才以上 11 才未満 大人の 1/2, 5 才以上 8 才未満 大人の 1/3, 3 才以上 5 才未満 大人の 1/4